

A MAGYAR ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÉKTORBAN TOTÁL CSÍPŐÍZÜLETI ENDOPROTÉZIS MŰTÉTEN ÁTESETT BETEGEK ÉLETMINŐSÉ-GÉNEK ÉS SZOCIODEMOGRÁFIAI JELLEMZŐINEK PILOT VIZSGÁLATA

Kajos L¹, Boncz I¹, Szóts B¹, Király B², Pónusz R¹, Gyuró M¹, Molics B²

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet

2. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

CÉL

Kutatásunk célja, az állami ellátási szektorban anterolaterális feltárásban végzett totál csípőízületi endoprotézis műtéten átesett betegek szociodemográfiai adatainak vizsgálata, és a műtét előtti és a műtétet követő életminőség összehasonlítása.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatunk mintáját a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika csípőprotézis műtéten átesett betegek adatai adták (n=31 fő: 15 nő, 16 férfi, átlagéletkor: 64,58 év), akiket kényelmi mintavételi technikai alkalmazásával választottunk ki. A felmérés egy összetett kérdőív kitöltéséből állt a műtét előtt, valamint a műtétet követő 6. héten, 2019. augusztus és november között. A kérdőív kitért a résztvevők szociodemográfiai adataira, a betegség és a műtét körülményeire, továbbá tartalmazott két nemzetközi, validált életminőség kérdőívet (SF-36 és Oxford Hip Score).

EREDMÉNYEK


A szociodemográfiai jellemzők vizsgálata (1. Táblázat) során azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek legnagyobb része városi (48,39%), illetve falusi lakos (32,26%). A megkérdezettek 61,29%-a rendelkezik középfokú, 22,58 % felsőfokú és 16,13% alacsony iskolai végzettséggel. A résztvevők nagy része (64,52%) nyugdíjas, 16,13% szellemi munkát végez. Családi állapotot tekintve a megkérdezettek többsége (64,52%) házasságban él, 16,13% özvegy. A műtét oka 74,19%-ban csípőízületi arthrosis volt (1. Táblázat). A 6 hét elteltével jelentősen javult az életminőség az SF-36 kérdőív szerint. A fizikai egészség pontszám szignifikáns javulást mutatott (28,87 pontról 46,6 pontra, p= 0,001) (1. Ábra), ám a mentális egészség pontszám emelkedése nem volt szignifikáns (67,14 pontról 71,14 pontra, p= 0,332) (2. Ábra). Az Oxford Hip Score pontszáma 18,68 pontról 30,74 pontra nőtt, mely szintén szignifikáns javulást jelent (p< 0,001) (3. Ábra).

KÖVETKEZTETÉSEK


Összességében láthatjuk, hogy az állami ellátási szektorban főként városi, középfokú iskolai végzettséggel rendelkező, többségében nyugdíjas páciensek találhatók. Eredményeink azt mutatták, hogy a csípőízületi endoprotézis műtétet követően jelentősen javult a betegek életminősége. Az SF-36 fizikai egészség pontszáma és az Oxford Hip Score szignifikáns növekedést mutatott.

		Betegszám (fő)	Megoszlás (%)
LAKHELY TÍPUSA	FALU	10	32,26
	VÁROS	15	48,39
	MEGYESZÉKHELY	6	19,35
	FŐVÁROS	0	0
ISKOLAI VÉGZETTSÉG	ALAPFOK	5	16,13
	KÖZÉPFOK	19	61,29
	FELSŐFOK	7	22,58
FŐÁLLÁSÚ FOGLALKOZÁS	ÁLLAMI ALKALMAZOTT	6	19,35
	MAGÁN ALKALMAZOTT	3	9,68
	VÁLLALKOZÓ	0	0
	EGYÉB (PL.: NYUGDÍJAS, MUNKANÉLKÜLI)	22	70,97
FOGLALKOZÁS TÍPUSA	SZELLEMI	5	16,13
	KÖNNYŰ FIZIKAI	2	6,45
	NEHÉZ FIZIKAI	2	6,45
	NYUGDÍJAS	20	64,52
	EGYÉB (PL.: MUNKANÉLKÜLI)	2	6,45
CSALÁDI ÁLLAPOT	HÁZAS	20	64,52
	PÁRKAPCSOLAT	2	6,45
	EGYEDŰLÁLLÓ	1	3,23
	ELVÁLT	3	9,68
	ÖZVEGY	5	16,13
DIAGNÓZIS	ARTHROSIS	23	74,19
	CSONTELHALÁS	3	9,68
	FICAM	3	9,68
	GYEREKKORI CSÍPŐBETEGSÉG	0	0
	TÖRÉS	0	0
	REVÍZIÓ	2	6,45


1. táblázat
Szociodemográfiai jellemzők és műtéti indikáció (diagnózis)



1. ábra
Fizikai egészség változása (SF-36)



2. ábra
Mentális egészség változása (SF-36)



3. ábra
Az Oxford Hip Score pontszám változása



Corresponding author:

Dr. Imre BONCZ, MD, MSc, PhD, Habil
University of Pécs, Faculty of Health Sciences, Hungary
Institute for Health Insurance
E-mail: imre.boncz@etk.pte.hu

